



LA BONNE UTILISATION DU DUROGESIC

Dr Nicolas SAFFON Équipe Résonance

L'AMM et les recommandations de l'OMS

- ❖ Dans le cancer...
- ❖ Douleurs stables...

- ❖ En cas de limite de la voie orale...
- ❖ ou dans l'intérêt du patient (polymédication orale)...

LE POSITIONNEMENT DU DUROGESIC

- ❖ **Nociceptives.**
 - ❖ Neuropathiques.
 - ❖ Psychogènes.
 - ❖ Mixtes (jusqu'à 80 % dans le cancer)
 - ❖ Douleurs incidentes



QUAND PRESCRIRE UN OPIOÏDE (DUROGESIC) ?


- ❖ D'emblée si douleur sévère
- ❖ Après échec d'un traitement par palier 2 bien conduit
- ❖ En relais d'un palier 3 (rotation des opioïdes)

Titration avec une libération normale




- But :**
- Éviter surdosage
 - Délivrer rapidement la dose minimum efficace
 - Surveiller les effets indésirables

PALIER DE L'OMS




EQUI-ANALGÉSIE PALIERS 2 ET PALIERS 3



LA DOULEUR CHRONIQUE

Pics algiques



COMMENT TRAITER ?

❖ PICS ALGIQUES > LIBÉRATION NORMALE

- > 1/6 à 1/10 de la dose de LP
- > Il est normal d'utiliser des interdoses : pics algiques et douleur qui évolue



PICS ALGIQUES

❖ Principe des interdoses ou doses de secours (1/6 à 1/10 de la dose totale) = opioïde libération normale

- > Actiskenan®
- > Sevredol®
- > Actiq®
- > Oxynorm®
- > Morphine injectable


❖ Voie orale = SC/2 = IV/3

❖ Intervalle de 1 h entre les interdoses*

* SOR

DUROGESIC® = FENTANYL + PATCH

1 molécule : le fentanyl



1 dispositif : le patch

LE FENTANYL

❖ Effets secondaires

- ✓ Nausées vomissements
- ✓ Somnolence diurne -30 % vs MLP
- ✓ Constipation -50 % vs MLP

❖ 100 fois plus puissant que la morphine

❖ Intérêt chez l'insuffisant rénal

- ✓ < 10 % des métabolites sont éliminés dans les urines sous forme inchangée

DISPOSITIF : LE PATCH



LE PATCH


❖ EN PRATIQUE

- > 1 patch = 3 jours d'antalgie
- > Equi-analgésie simple
- > Baisse du nombre de prises orales
- > Bonne acceptation par le patient
- > Indépendant de l'état digestif du patient

❖ PHARMACOCINETIQUE

- > Biodisponibilité importante
- > Pas de cycle entéro-hépatique
- > Stabilité des taux plasmatiques

APPLICATION DU PATCH




ZONE

- plane
- propre
- sèche
- glabre (*poils coupés aux ciseaux*)
- non irritée
- non irradiée


de préférence : torse - bras

APPLICATION DU PATCH



- Appliquer *immédiatement* après ouverture du sachet scellé
- Appuyer fermement pendant 30 secondes d'abord au centre puis vers la périphérie

APPLICATION DU PATCH



- Dispositif à remplacer toutes les 72 heures
- Appliquer à des endroits différents à chaque fois

ORDONNANCE SÉCURISÉE

Identification du patient
 Dr JEAN ALAIN
 MEDECINE GENERALE
 123 rue Maréchal
 31 000 Toulouse
 tél : 03 83 04 00 96

Le 26 avril 2007 **Date**
 Mr Jules Valmont
 68 ans, 1,75m, 72 kg
 20 rue du Ménil 31 000 Toulouse

Dosages prescrits
 1- DUROGESIC vingt cinq microgrammes par heure,
 Un patch toutes les soixante-douze heures
 pendant vingt huit jours à délivrer en une fois,
 soit DIX PATCHS.

Quantités totales prescrites
 2- Sulfate de morphine en comprimés à libération
 immédiate, Comprimés à dix milligrammes
 Prendre un comprimé en cas de douleur
 Respecter un intervalle d'au moins une heure entre
 chaque prise.

Signature 

QUATRE BOITES

Nombre de spécialités prescrites dans la case: 2

De la bonne utilisation dépend :

**Efficacité
antalgique**



**Facilité
d'utilisation**



**Sécurité
d'emploi**
