


ETIQUETTE PATIENT



ETIQUETTE SERVICE

## Echelle ALPS-Neo d'évaluation de la douleur aiguë et prolongée

Astrid Lindgren and Lund Childrens' Hospitals Pain and Stress Assessment Scale for  
Preterm and Sick Newborn Infants. Lundqvist P, Kelberg A, et al, 2014.

ITEMS	PROPOSITIONS
<b>VISAGE</b>	<b>0</b> = Visage détendu <b>1</b> = Visage crispé, grimace légère <b>2</b> = Visage très crispé, pleurs, bouche ouverte, menton tombant
<b>RESPIRATION</b>	<b>0</b> = Calme sans effort <b>1</b> = Discret tirage, respiration irrégulière, pauses brèves <b>2</b> = Tirage, polypnée, apnées
<b>TONUS DES MEMBRES</b>	<b>0</b> = Normal <b>1</b> = Tonus variable <b>2</b> = Hyper-extension ou Bras et jambes mous
<b>EXTREMITES (mains et pieds)</b>	<b>0</b> = Relâchées <b>1</b> = Serre le poing, essai d'agripper, mains sur la face <b>2</b> = Serre fort poing/orteils crispés, doigts/orteils écartés, mains/pieds mous
<b>ETAT de VEILLE-SOMMEIL et ACTIVITE</b>	<b>0</b> = Eveil calme, Sommeil calme <b>1</b> = Agitation motrice occasionnelle <b>2</b> = Agitation motrice persistante, épuisé
<b>TOTAL</b>	

**Evaluation de la douleur aiguë et prolongée doit être réalisée** : au moins une fois par équipe ; toutes les 3 heures ou de manière plus régulière selon les Actions recommandées ci-dessous.

Score	Actions Recommandées
<b>3 ≤ score &lt; 5</b>	Essayer antalgie non-pharmacologique et évaluer l'impact.
<b>Score ≥ 5</b>	Antalgie non- pharmacologique et réévaluation 5' plus tard.
<b>Si score ≥ 5 persiste</b>	Envisager un médicament antalgique après discussion avec le médecin.

### LES POSOLOGIES DU GLUCOSE A 30%

POIDS	Glucose 30% volume (quantité) PRISE	Glucose 30% quantité maximun / JOUR
< 1.5 kg	0,2ml (0,06g)	0,2ml x8 (0,48g)
1.5 - 2 kg	0,3ml (0,09g)	0,3ml x8 (0,72g)
2 - 2.5 kg	0,5ml (0,15g)	0,5ml x8 (1,2g)
2.5 - 3 kg	1ml (0,30g)	1ml x8 (2,4g)
3 mois ou 3 kg	1,5 à 2ml (0,45 à 0,60g)	1,5 à 2ml x 8 (3,6 à 4,8g)

L'administration du glucose à 30% se notifie dans le dossier du patient (*feuille blanche du diagramme de suivi*) de la manière suivante : solution sucrée (SS1, SS2, SS3...) maximun 8 administrations par jour