



Etre soigné,

c'est aussi être informé

Utilisation du Valium

en cas de convulsions : des gestes simples

Centre de compétence Epilepsies Rares de neurologie pédiatrique

Ateliers éducatifs

Dr Claude CANCÈS, Dr Camille TISON, Médecins référents

Hôpital des Enfants

330, avenue de Grande Bretagne - TSA 70034 - 31059 Toulouse Cedex 9

Hôpital Pierre-Paul RIQUET - Hall C - Niveau 4

Place du Docteur Baylac - TSA 40031 - 31059 Toulouse Cedex 9

Définition

Une convulsion se caractérise le plus souvent par la survenue brutale d'un trouble de la conscience et de contractures musculaires rythmiques. Elle provient d'un dysfonctionnement du cerveau.

Elle est souvent très impressionnante, mais ne présente qu'exceptionnellement un danger grave pour votre enfant.



Equipe de l'atelier éducatif

- Médecins référents :
Dr Camille TISON, Dr Claude CANCÈS
- Infirmiers référents :
Séverine BREIL, Béatrice PRIVAT, Amandine COUDERC
- Psychologue référente :
Michèle DUFOURG

Conduite à tenir en cas de crise

1

Coucher l'enfant sur le côté en position latérale de sécurité

2

Ne PAS METTRE d'objet ou vos doigts dans la bouche pour tenter de l'ouvrir

3

Prendre la température rectale de votre enfant s'il est connu pour faire des convulsions fébriles

4

Utiliser le Valium au bout de 5 minutes de crise

5

Prévenir votre médecin traitant, le SAMU ou les urgences


Utilisation du Valium

1

Préparer le matériel.



2



Casser l'ampoule au niveau du point bleu à l'aide d'un chiffon ou d'un habit pour ne pas se blesser.

3



Prendre le contenu en entier de l'ampoule, puis ajuster la quantité désirée : **QUANTITE = POIDS (Kg) / 10** :

ex : 12kg = 1.2ml

Si >20 kg = 1 ampoule entière

4

Prendre de l'air dans la seringue jusqu'au chiffre 5.



5

Adapter
la canule rectale
à la seringue.



6

Introduire
la canule dans
l'anus, le piston de
la seringue toujours
en l'air.



7

Pousser le piston jusqu'au bout et attendre
1 minute en laissant la canule dans l'anus.

Numéros d'urgence

Médecin traitant :

.....

SAMU : 15

Service de Neuropédiatrie

Tél. 05 34 55 86 32

**Votre enfant doit être vu par un médecin dans les 24 heures
qui suivent la convulsion.**



Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse Cedex 9

Hôpital Pierre-Paul RIQUET
Place du Docteur Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9

**Conception
Neurologie**