Livret d'informations

Hôpitaux de Toulouse

*Etre soigné,*
*c'est aussi être informé*

# Utilisation du buccolam® en cas de crise d'épilepsie : des gestes simples


## Centre de compétence Epilepsies Rares de neurologie pédiatrique

Dr Claude CANCÈS, Dr Camille TISON, Médecins référents

## Hôpital des Enfants

330, avenue de Grande Bretagne - TSA 70034 - 31059 Toulouse Cedex 9

## Hôpital Pierre-Paul RIQUET - Hall C - Niveau 4

Place du Docteur Baylac - TSA 40031 - 31059 Toulouse Cedex 9



Code : 403944



Pôle Enfants

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

*Une crise d'épilepsie se caractérise le plus souvent par la survenue brutale d'un trouble de la conscience et de contractures musculaires rythmiques. Elle provient d'un dysfonctionnement du cerveau.*
*Elle est souvent très impressionnante, mais ne présente qu'exceptionnellement un danger grave pour votre enfant.*
*Si une épilepsie a été diagnostiquée et confirmée pour votre enfant, il peut bénéficier de la prescription de Buccolam® en cas de crise prolongée.*

## Composition de l'équipe

- **Médecins référents :**
  Dr Camille TISON, Dr Claude CANCÈS
- **Infirmière de coordination épilepsie :**
  Séverine BREIL
- **Infirmièress référentes :**
  Béatrice PRIVAT, Amandine COUDERC
- **Psychologue référente :**
  Michèle DUFOURG

# Qu’est-ce que le Buccolam® ?

C’est un médicament à base de midazolam que l’on peut prescrire pour stopper une crise se prolongeant au-delà de 5 minutes chez un enfant atteint d’épilepsie.
Il peut être administré en milieu extra-hospitalier (domicile, école…) à l’intérieur de la joue (entre la joue et les dents).
La prescription se fait sur une ordonnance spéciale dite « sécurisée », par un pédiatre, neuropédiatre ou neurologue.

# Conduite à tenir en cas de crise d'épilepsie

1

Coucher l'enfant **sur le côté en position latérale de sécurité,** essayer de protéger la tête avec un vêtement ou coussin...

2

**Ne PAS METTRE d'objet ou vos doigts dans la bouche** pour tenter d'ouvrir les mâchoires (risque de blessure pour l'enfant et vous-même)

3

**Utiliser le Buccolam®** si la crise se prolonge au-delà des premières minutes **(5 minutes)**

# Utilisation du BUCCOLAM®

1

Ouvrir la capsule contenant la seringue de Buccolam®

2

Enlever le capuchon rouge (penser à le mettre à la poubelle pour éviter tout risque d'étouffement)

3

Tourner légèrement la tête de l'enfant vers le ciel afin de pouvoir plus facilement introduire la seringue

4

Introduire doucement l'embout de la seringue entre la joue et les dents, contre la gencive et pousser lentement le produit à l'aide du piston : on peut faire la moitié du produit d'un côté et le reste de l'autre afin que le produit ne déborde pas de la joue



5

Repositionner l'enfant sur le côté pour protéger ses voies aériennes tant qu'il est inconscient

6

**Si la crise de l'enfant n'a pas cédé dans les 10 minutes suivant l'administration du médicament,**

## APPELER LE SAMU (15) :

**ne pas faire de 2e dose sans avis médical**

# Numéros d'urgence

**Médecin traitant :**

.....

**SAMU : 15**

**Service de Neuropédiatrie**
**Tél. 05 34 55 86 32**

**Hôpital des Enfants**
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse Cedex 9

**Hôpital Pierre-Paul RIQUET**
Place du Docteur Baylac
TSA 40031
31059 Toulouse Cedex 9

**Conception**
Neurologie

**Conception graphique (août 2012) - mise à jour décembre 2014** : Direction de la Communication
**Impression** : Centre de Reprographie du CHU de Toulouse
© **2012, CHU Toulouse** - 2, rue Viguerie - TSA 80035 - 31059 Toulouse Cedex 9