



PERCEPTION DU RISQUE TERATOGENE DES MEDICAMENTS

ENQUETE MENEES AUPRES DE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
DE MIDI-PYRENEES

Collectif de Pharmacologie sociale

14 Février 2006

Risque




Objectif




- Evaluer la perception du risque malformatif et foetotoxique médicamenteux des professionnels de santé

Méthode

- > Questionnaire auprès de 207 professionnels de santé :
 - 103 médecins généralistes
 - 104 pharmaciens d'officines
- > Avant les formations continues
- > Récupérées à la fin de chaque séance

Périodes de Risque






Influence de la profession et du sexe

- Médecin ou Pharmacien :
 - Pas de différence dans appréciation globale (45% environ)
 - - de sans opinion chez les médecins
 - Meilleure connaissance des médicaments hors liste par pharmaciens
- Homme ou femme :
 - Les femmes surestiment d'avantage la valeur du risque (40% chez femmes, 50% hommes)

FACTEURS INTERVENANT DANS L'OPINION



Conséquences d'une surestimation du risque

- « sous-traiter » la patiente
- Inquiéter et conduire à une IVG
- Renoncer à une grossesse lors d'une pathologie traitée au long cours
- Difficulté de rassurer une femme ayant donné naissance à un enfant porteur d'une malformation (culpabilité)

