

# L'équipe de soins

**Vous accueille et vous informe**

**Urgences Médicales**

Docteur ISABELLE CLAUDET, Responsable d'Equipe Médicale

**Urgences Chirurgicales**

Docteur HOCINE REKHROUKH, Responsable d'Equipe Médicale

**Hôpital des Enfants - Niveau 0**

330, avenue de Grande-Bretagne - TSA 70034 - 31059 Toulouse Cedex 9

**Conseils aux parents**

**Conduite à tenir en cas de fièvre  
chez votre enfant**

**La fièvre ou hyperthermie est une température supérieure à 38,5°C , en rectal. Elle est le témoin d'une infection bactérienne ou virale en cours d'évolution. Si elle est très élevée, la fièvre peut être dangereuse pour votre enfant et peut être responsable de convulsions.**

**Prendre la température de votre enfant avec un thermomètre placé dans l'anus.**

› Si la température est située entre **36,5°C et 37,5°C** :  
**PAS DE FIÈVRE.**

› Si la température est située entre **37,5°C et 38,5°C** :  
**FIÈVRE MODÉRÉE.**

### **Conduite à tenir**

- Déshabiller votre enfant : un maillot de corps et une couche suffisent largement.
- Reprendre la température 4 heures plus tard.  
Si la température persiste : **consulter votre médecin traitant.**

› Si la température est supérieure à **38,5°C** :  
**FIÈVRE ÉLEVÉE.**

### **Conduite à tenir**

- 1** Déshabiller l'enfant
- 2** Appeler votre médecin

- 3** Possibilité de donner un bain à votre enfant seulement si vous avez un thermomètre de bain : **la température du bain doit être de 2 degrés en dessous de la température de votre enfant.**  
**Durée du bain** : 10 minutes.

### **Exemple :**

Température de l'enfant = 39°C  
donc température du bain = 37°C.

- 4** Mettre votre enfant au calme, dans une pièce chauffée à **20 ou 21°C.**
- 5** Faire boire de l'eau à votre enfant entre les biberons et les repas.
- 6** Donner les antithermiques (médicaments contre la fièvre).  
**Suivre l'ordonnance du médecin.**
- 7** Surveiller la température toutes les 4 heures (nuit et jour).

### **Hôpital des Enfants**

330, avenue de Grande-Bretagne  
TSA 70034  
31059 Toulouse Cedex 9

### **Conception**

Pôle Spécialisé d'Urgences  
Médico-Chirurgicales

**La fièvre ou hyperthermie est une température supérieure à 38,5°C, en rectal. Elle est le témoin d'une infection bactérienne ou virale en cours d'évolution. Si elle est très élevée, la fièvre peut être dangereuse pour votre enfant et peut être responsable de convulsions.**

**Prendre la température de votre enfant avec un thermomètre placé dans l'anus.**

› Si la température est située entre **36,5°C et 37,5°C** :  
**PAS DE FIÈVRE.**

› Si la température est située entre **37,5°C et 38,5°C** :  
**FIÈVRE MODÉRÉE.**

#### **Conduite à tenir**

- Déshabiller votre enfant : un maillot de corps et une couche suffisent largement.
- Reprendre la température 4 heures plus tard.  
Si la température persiste : **consulter votre médecin traitant.**

› Si la température est supérieure à **38,5°C** :  
**FIÈVRE ÉLEVÉE.**

#### **Conduite à tenir**

- 1** Déshabiller l'enfant
- 2** Appeler votre médecin

- 3** Possibilité de donner un bain à votre enfant seulement si vous avez un thermomètre de bain : **la température du bain doit être de 2 degrés en dessous de la température de votre enfant.**  
**Durée du bain** : 10 minutes.

#### **Exemple :**

*Température de l'enfant = 39°C  
donc température du bain = 37°C.*

- 4** Mettre votre enfant au calme, dans une pièce chauffée à **20 ou 21°C.**
- 5** Faire boire de l'eau à votre enfant entre les biberons et les repas.
- 6** Donner les antithermiques (médicaments contre la fièvre).  
**Suivre l'ordonnance du médecin.**
- 7** Surveiller la température toutes les 4 heures (nuit et jour).

#### **Hôpital des Enfants**

330, avenue de Grande-Bretagne  
TSA 70034  
31059 Toulouse Cedex 9

#### **Conception**

Pôle Spécialisé d'Urgences  
Médico-Chirurgicales