



L'Enfant Maltraité LA PREVENTION

Enfant Maltraité :

Connaître les facteurs de risque (1)

- **Ceux liés à l'enfant :**
 - au moment de la grossesse: grossesse non désirée ou pathologique, grossesse multiple, mère isolée...
 - au moment de la naissance: prématurité, handicap, séparation mère-enfant .
 - après la naissance : les pleurs du nourrisson, les troubles du sommeil ou alimentation, hyperactivité.....

Enfant Maltraité :

Connaître les facteurs de risque (2)

- **Ceux liés aux parents:**
 - Carence affective, Troubles psychiatriques
 - Alcoolisme et toxicomanie
 - ATCD maltraitance (30%)
 - Dysfonctionnement couple
 - Parents jeunes, famille monoparentale et milieu socio économique défavorisé
 - Isolement familial et social

Prévention

Indicateurs de Risque de Mauvais Traitements

- Age maternel < 18 ans
- ATCD parentaux de maltraitance
- ATCD de mauvais traitements à la fratrie
- Pathologie affective parentale
- Conditions socio-économiques défavorisées
- Pathologies psychiatriques parentale
- Grossesses multiples
- Pathologies obstétricales pouvant altérer les relations Parents-Enfants
- Dénier de grossesse

Le syndrome des bébés secoués

Prévention (1)

- Information sur les dangers des secousses et conduite à tenir en cas de malaise :
 - Parents
 - Assistantes maternelles
 - Personnel de crèche
- Lien entre pleurs des enfants et secousses :
 - Etude récente dans le Lancet (Reijneveld et al., 2004) :
5.6 % parents de 3259 enfants de moins de 6 mois reconnaissent des gestes inappropriés en cas de pleurs
- Prévention en général de la maltraitance :
 - Repérage des situations à risques dès la grossesse

Le syndrome des bébés secoués

Prévention (2)

Toujours se dire que bébé est fragile



AFIREM