



## Le syndrome des bébés secoués

### **Le syndrome des bébés secoués**

#### *Généralités*

- Ou Shaken Baby Syndrome (SBS)
- Cause la plus fréquente des TC graves enfants < 1 an
- Première description en 1972 par John Caffey
- Problématique spécifique au sein de la maltraitance d'enfant

## Le syndrome des bébés secoués

### *Description*

- Association chez un nourrisson < 2 ans :
  - hémorragie péricérébrale
  - saignement oculaire
  - des lésions fracturaires des membres
- sans signe extérieur de violence

## Le syndrome des bébés secoués

### *Données épidémiologiques*

- Incidence annuelle (*Etudes récentes 1998 & 2000*) : **21 à 24.6/100 000 enfants < 1an**
- **95 % des traumatismes crâniens sévères** (sauf AVP, chutes élevées) sont dus à une maltraitance (*Billmire et Myer, 1985*)
- Nourrissons de moins de 2 ans avec un âge moyen entre **3 et 6 mois**
- Prédominance de **garçons** (53 à 70 % des cas)

## **Le syndrome des bébés secoués**

### *Données épidémiologiques*

- *Responsable des secousses* :
- (Starling et al., 1995)*
- Père biologique 37 %
- Compagnon de la mère 20,5 %
- Femme baby-sitter 17 %
- Mères 12,6 %