



LE BULLETIN DU

CENTRE MIDI-PYRENEES D'EVALUATION ET D'INFORMATION SUR LA PHARMACODEPENDANCE


Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus et de Pharmacodépendance Résultats OSIAP 2003

Le recueil des Ordonnances Suspectes a été effectué, en 2003, à partir des réseaux de pharmaciens d'officine constitués par les 6 CEIPs, les 4 CEIPs associés et un réseau constitué par le service de Pharmacologie Clinique de Poitiers. La surveillance des ordonnances suspectes s'est déroulée au cours de deux périodes annuelles de 4 semaines chacune en mai et novembre 2003.

Nous avons recueilli au total 521 ordonnances falsifiées en 2003 versus 400 en 2002.

CEIP	Nombre de pharmacies de la région	Nombre de Pharmacies sollicitées Mai / Novembre	Nombre d'OF recueillies 2003	Nombre d'OF recueillies 2002
Bordeaux	1304	150 153	11	14
Caen	4410	195 199	46	59
Grenoble	1208	166 295	44	54
Lyon	1501	142 157	74	12
Marseille	2043	120 119	35	25
Montpellier	1018	149 159	26	8
Nancy	739	100 100	41	30
Nantes	1474	83 87	14	35
Paris	5118	150 152	101	59
Toulouse	1102	195 195	103	104
Poitiers	698	21 21	26	-
Total	22 697	1471 1637	521	400

Palmarès des médicaments impliqués par région



Le palmarès des médicaments impliqués dans les ordonnances suspectes figure dans le tableau suivant.

POURCENTAGE d'Ordonnances Falsifiées (NOMBRE)						
Dénomination Commune Internationale	Spécialités	2003 n=521	2002 n=400	2001 n=414	2000 n=304	1999 n=224
flunitrazépam	Rohypnol	10,4 % (54)	15% (60)	19,1% (79)	28,3% (86)	30,8% (69)
buprénorphine	Subutex	9,6% (50)	6,8% (27)	9,4% (39)	7,2% (22)	6,3% (14)
zolpidem	Stilnox	9% (47)	10,3% (41)	8% (33)	6,9% (21)	1,8% (4)
zopiclone	Imovane Zopiclone	4,2% (22)	3,3% (13)	2,4% (10)	4,3% (13)	3,1% (7)
morphine	Skénan Actiskénan	4,2% (22)	3,8% (15)	1% (4)	3,3% (10)	-
bromazépam	Lexomil Bromazépam	3,1% (16)	5,8% (23)	5,3% (22)	12,5% (38)	3,1% (7)
clorazépate	Tranxène	3,1% (16)	5,3% (21)	2,4% (10)	6,3% (19)	3,6% (8)

Dénomination Commune Internationale	Spécialités	2003 n=521	2002 n=400	2001 n=414	2000 n=304	1999 n=224
alprazolam	Xanax Alprazolam	2,7% (14)	2% (8)	0,5% (2)	2,6% (8)	-
Paracétamol + dextropropoxyphène	Di-Antalvic Propofan Dialgirex, Dioalgo	2,7% (14)	1,8% (7)	0,7% (3)	1% (3)	0,9% (2)
clonazépam	Rivotril	2,5% (13)	1% (4)	1,4% (6)	-	0,9% (2)
lorazépam	Temesta	2,5% (13)	2,8% (11)	1,4% (6)	1,3% (4)	2,2% (5)
fluoxétine	Prozac	2,3% (12)	1,8% (7)	0,2% (1)	1% (3)	-
paroxétine	Deroxat	2,3% (12)	0,25% (1)	-	-	-
bétaméthasone	Diprosone, Diprosalic Diprolene	2,3% (12)	1% (4)	-	-	-
paracétamol + codéine	Dafalgan codéiné Efferalgan codéiné	1,9% (10)	0,5% (2)	4,1% (17)	1,6% (5)	-
diazépam	Valium	1,5% (8)	0,8% (3)	1,4% (6)	1% (3)	1,8% (4)
lévothyroxine	Levothyrox	1,3% (7)	0,5% (2)	0,2% (1)	0,7% (2)	-
macrogol	Forlax Movicol	1,3% (7)	0,8% (3)	-	-	-
furosémide	Lasilix Furosemide	1,2% (6)	0,5% (2)	-	-	-

Le nombre de réseaux de pharmaciens d'officine s'est élargi (réseau de pharmaciens de Poitiers), et la participation des pharmaciens sollicités augmente régulièrement : 27,6% en mai 2002 ; 39,5% en novembre 2002 ; 57,5% et 58,6% en mai et novembre 2003.

Parmi les médicaments identifiés, le Rohypnol^o arrive toujours en tête mais on observe une diminution continue de la proportion de citations. Le pourcentage de citations concernant le Subutex^o, le Stilnox^o, le Skénan^o et l'Imovane^o reste constant et relativement important depuis 2001; celui de Rivotril^o a plus que doublé par rapport au recueil précédent.

Le taux d'ordonnances volées et de vraies fausses ordonnances (fabriquées) augmente depuis 2001 (2,6% en 2001 versus 8,3% d'ordonnances volées en 2003 et 1,7 versus 9,1% de fausses ordonnances).



Bravo et merci à tous les pharmaciens du réseau Midi-Pyrénées pour leur active et précieuse participation.

La rubrique du Centre Pierre DUMAS (Antenne Médicale de Lutte contre le Dopage)

Tél. : 05 61 77 79 83 / Fax : 05 61 77 79 84 – Mail : aml31@cict.fr

Le 15 janvier 2004, 19 adeptes du body-building ont été interpellés dans le sud de la France, dont 10 dans l'Ariège. Une soixantaine de produits ont été saisis : anabolisants sous de nombreuses formes, diurétiques, corticoïdes, gonadotrophines, hormones thyroïdiennes, sildénafil, etc...

Avec ces substances, régulièrement utilisées pour le dopage par certains culturistes, se trouvaient de grandes quantités de loperamide et 90 capsules de ritonavir (Norvir^o).

Il est, bien sûr, possible que le ritonavir ait été prescrit à une personne séropositive qui n'a pas divulgué son état de santé.

On peut aussi s'interroger sur la dérive possible de l'utilisation de ce puissant inhibiteur du cytochrome P450, qui augmente considérablement la concentration sérique de nombreux produits : amphétamines, AINS, benzodiazépines, corticoïdes, morphinomimétiques, sildénafil, etc...



Nous vous rappelons qu'en dehors des périodes d'enquête, tout cas d'abus ou de pharmacodépendance grave ou inattendu, notamment suspecté lors de la présentation d'une ordonnance falsifiée, doit être déclaré obligatoirement au CEIP (Décret du 31 mars 1999).

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par courrier électronique, merci de nous le signaler à : ceip.toulouse@cict.fr
N'hésitez pas à nous contacter au 05-62-26-06-90 ou à nous envoyer vos observations par courrier ou fax : 05.61.25.51.16 ou E-mail : ceip.toulouse@cict.fr
Site internet : www.pharmacovigilance-toulouse.com.net

