

# Le Bulletin du



Centre d'Évaluation et d'Informations sur les Pharmacodépendances

## Recueil des demandes d'Artane<sup>®</sup> et de Survector<sup>®</sup>

Dans le cadre de la surveillance des médicaments susceptibles d'être détournés de leur usage, nous avons sollicité le Réseau Midi-Pyrénées des Pharmaciens d'Officine afin de réaliser un recueil exhaustif des demandes d'Artane<sup>®</sup> (trihexyphénidyle) et de Survector<sup>®</sup> (amineptine) pendant une semaine (du 17 au 22 Novembre 1997).

### RESULTATS

67 / 198 pharmacies (soit 34% de participation) ont relevé :

54 ordonnances d'Artane<sup>®</sup>

43 ordonnances de Survector<sup>®</sup>

#### Patients

Age moyen des consommateurs : 53 ans.

Particularité du Survector<sup>®</sup> : consommation essentiellement féminine (62%).

#### Posologie

Artane<sup>®</sup> : posologie moyenne de 10 mg/j [2-15 mg/j] en conformité avec la posologie validée (Vidal<sup>®</sup>).

Survector<sup>®</sup> : posologie moyenne de 1,5 cp/j [0,5-4 cp/j]). Dans 2 cas, la posologie est supérieure à celle préconisée par le Vidal<sup>®</sup> (1 à 2 cp/j) : 3 et 4 cp/j respectivement.



### Prescripteurs et type d'ordonnance

**Artane<sup>®</sup>** : prescrit soit par des généralistes (50%), soit par des psychiatres ou des neurologues (38%).

**Survector<sup>®</sup>** : principalement prescrit par des généralistes (77%).



### Ordonnances suspectes

**Artane<sup>®</sup>** : 6% d'ordonnances suspectes (3 ordonnances) :

2 cas : attitude suspecte du client (hommes de 30 ans).

1 cas : surcharge de posologie (femme de 60 ans).

**Survector<sup>®</sup>** : 7% d'ordonnances suspectes (3 ordonnances) :

1 cas : ordonnance falsifiée (femme de 32 ans).

1 cas : surcharge de posologie (homme de 29 ans).

1 cas : client connu pour son nomadisme médical et pharmaceutique (homme de 40 ans).

2 ordonnances associent Survector<sup>®</sup> - Rohypnol<sup>®</sup>.

## L'expérience Marseillaise sur le Survector<sup>®</sup>

89 pharmaciens sentinelles des Bouches du Rhône ont recueillis 21 ordonnances dont 4 concernent des toxicomanies supposées.

Les patients sont en majorité des femmes (66%) dont l'âge est supérieur à celui des hommes (70 ans versus 54 ans).

Dans les 4 cas de toxicomanies supposées :

- le Rohypnol<sup>®</sup> est le principal médicament associé au Survector<sup>®</sup>
- la posologie est anormale ( $\geq 3$  cp/j).

## CONCLUSION

**Artane<sup>®</sup>** : La pharmacodépendance à l'Artane<sup>®</sup>, utilisé pour ces propriétés hallucinogènes et anticholinergiques, est peu connue. Pourtant 6% des ordonnances recueillies sont suspectes!!! A suivre ...

**Survector<sup>®</sup>** : Le Survector<sup>®</sup>, médicament psychostimulant, a fait l'objet en 1994 d'un certain nombre de mesures officielles (maintien sur Liste I, arrêt de publicité, information médicale et publique sur le risque de pharmacodépendance). Malgré ces dispositions, les enquêtes effectuées par les CEIP ne retrouvent pas de diminution des cas de pharmacodépendance.

**Nous vous rappelons qu'en dehors des périodes de recueil intensif, toutes les cas de dépendance ou d'abus identifiés par des ordonnances ou demandes suspectes nous intéressent...**

**N'hésitez pas à nous les envoyer (par fax au 05-61-51-16 ou par courrier) ou à nous contacter au 05-62-26-06-90.**