

Protocoles et procédures pour traiter la douleur

Les protocoles listés ci-dessous sont validés par le comité de lutte contre la douleur (Clud) du CHU de Toulouse.

Ils peuvent être mis à disposition des professionnel·les de santé extérieur·es au CHU de Toulouse qui en font la demande. Pour ce faire, vous pouvez adresser un [mail](#) à Mme Line Beyrouthi.

Protocoles de prise en charge de la douleur

- **En pédiatrie**
 - Protocole d'utilisation de la pompe à morphine sécurisée en néonatalogie
 - Protocole d'utilisation d'une pompe à morphine sécurisée en pédiatrie
 - Protocole antalgique pour les réductions de fracture en salle des plâtres à la consultation
 - Solution sucrée
 - Analgésie sédatrice aux urgences
 - Fiche posologique Oramorph Topalgic
 - Protocole d'utilisation de la kétamine en pédiatrie
 - Protocole de prise en charge des effets indésirables des morphiniques chez l'enfant
 - Protocole ponction et drain pleural en pédiatrie
 - Protocole Midazolam en pédiatrie
 - Protocole de sédation vigile pour fibroscopie bronchique en pédiatrie
 - Protocole de prise en charge de la douleur aiguë en pathologies chirurgicales pédiatriques
 - Protocole injection toxine botulique en pédiatrie
- **Chez l'adulte**
 - Fiche information des patients adultes sur le traitement par morphine ou dérivé
 - Procédure d'utilisation de la Naloxone par voie nasale
 - FENTANYL patch
 - Lidocaïne Prilocaine (EMLA) crème et patch
 - Lidocaïne nébuliseur
 - Morphine PCA adulte hors postop
 - Morphine Oxycodone PCA ADULTE postop
 - Diffuseur élastomérique (EASYPUMP) et anesthésiques locaux
 - Fentanyl transmuqueux dans les accès douloureux paroxystiques (ADP)
 - Douleur palier 1
 - Douleur paliers 1 et 2
 - Modalités de relais entre opioïdes
 - Douleur et toxicomanes substitués

- Encombrement bronchique
- Prise en charge des EFFETS INDESIRABLES des MORPHINIQUES chez l'ADULTE
- Lidocaïne gel urétral
- Protocole d'utilisation des patchs de QUTENZA
- Table conversion palier II et III
- Ropivacaïne par cathéter nerveux périphérique
- Procédure d'utilisation de la Naloxone en cas de surdosage aux opoïdes
Antagonisation des opoïdes
- Prévention douleur induite
- Protocole d'utilisation du Mélange Equimolaire Oxygène - Protoxyde d'Azote
– MEOPA
- Midazolam douleur induite
- Fiche posologique oramorph topalgic
- Protocole de prise en charge de la douleur aigue par Sufentanil intranasal
- Opiïdes titration voie orale (VO) et injectable
- Ordonnanciers sécurisés : création/modification d'une maquette
d'ordonnances sécurisées.